

اعمال میدان‌های الکتریکی برای جلوگیری از تجمع پپتیدهای آمیلوئید بتا بر روی غشاء سلولی: یک شبیه‌سازی دینامیک مولکولی

نفیسه صالحی نجف‌آبادی^{۱*}، امیرلهراسبی^۲

^۱شیمی فیزیک، دانشگاه اصفهان na_salehi84@yahoo.com

^۲-استاد، فیزیک، دانشگاه اصفهان lohrasebi@phys.ui.ac.ir


واژگان کلیدی: بیماری آلزایمر، میدان الکتریکی، تجمع آمیلوئید بتا، غشاء سلولی، شبیه‌سازی

۱- مقدمه

بیماری آلزایمر با تجمع پپتیدهای آمیلوئیدی مختلف بر روی غشای سلول‌های عصبی همراه است. گرچه مطالعاتی در این زمینه انجام شده‌است (۳۱ و ۳) اما اثرات غیر حرارتی میدان‌های الکتریکی گیگاهرتز در این موضوع هنوز به خوبی شناخته نشده‌است (۲). از این رو، در این مطالعه، با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکول تأثیر میدان‌های الکتریکی ۱ و ۵ گیگاهرتز بر تجمع پروتئین‌های پپتید آمیلوئید بر روی غشای سلولی بررسی شده‌است. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد نفوذ پپتید به غشاء با افزایش فرکانس افزایش می‌یابد.

۲- روش

شبیه‌سازی با نرم‌افزار GROMACS v.2018.5 انجام شد. جهت اجرای شبیه‌سازی‌ها برای بررسی اثر شدت میدان الکتریکی و همچنین اثر فرکانس، در میزان تجمع آمیلوئید بتا سامانه‌ای طراحی شد شامل غشاء دو لایه لیپیدی با نام POPC شامل ۱۲۷ لیپید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این غشاء از کلسترول غنی شده‌است. حلال و یون نیز به این مجموعه اضافه می‌شود. در نهایت پپتید الیگومر آمیلوئید بتا در یک طرف غشاء قرار می‌گیرد. به این ترتیب یک سلول واحد جهت انجام مطالعات تشکیل می‌شود. میدان‌های متناوب به کارگرفته شده ۱ و ۵ گیگاهرتز، با شدت‌های ۰/۰۲۷ V/nm و ۰/۰۷۷ V/nm هستند. مجموعاً سه شبیه‌سازی طراحی شد که شکل‌های نهایی این شبیه‌سازی‌ها پس از زمان ۱۰۰ نانوثانیه در معرض میدان الکتریکی در شکل ۱ نشان داده شده‌است.




۳- بحث

مجموعاً چهار شبیه‌سازی طراحی شده‌است که در جدول ۱ فهرست آن‌ها مشاهده می‌شود.

جدول ۱: پارامترها و حالت‌های میدان الکتریکی اعمال شده در موارد مختلف		
E0 (mv/nm)	ν (GHz)	حالت
۰	۰	Case-I
۲۰	۱	Case-II
۷۰	۱	Case-III
۲۰	۵	Case-IV

مولکول‌های لیپید غشاء دارای دو شاخه هستند که با نام‌های پالمیتویل و اولئویل شناخته می‌شوند. پارامتر نظم برای این دو شاخه با فرمول $S_{CD} = \langle \frac{3}{2} (\cos^2 \theta) - \frac{1}{2} \rangle$ محاسبه می‌شود. در این عبارت، زاویه‌ای که مشخص‌کننده میزان انحراف دم لیپید است (θ) در طول شبیه‌سازی اندازه‌گیری می‌شود. برای سهولت کار در نمودارهای پارامتر نظم شکل ۲، شاخه‌ها را با نام‌های SN1 و SN2 معرفی کرده‌ایم.



همانطور که مشاهده می‌شود افزایش در قدرت میدان الکتریکی تا ۷۰ میلی ولت بر نانومتر، مولکول‌های لیپید را از حالت نرمال خارج کرده‌است و افزایش در فرکانس تا ۵GHz باعث شده‌است مولکول‌های غشاء در شاخه پالمیتویل منظم‌تر شوند.

۹- نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج ذکر شده می‌توان گفت میدان الکتریکی با شدت بالاتر می‌تواند در جلوگیری و بهبود بیماری آلزایمر مؤثر باشد اما افزایش فرکانس نتیجه عکس داشته و احتمالاً باعث شدت بیماری می‌شود. حالت بهینه در بین میدان‌های اعمال شده یک گیگاهرتز و میدان ۰/۰۷۷V/nm در زمان صد نانوثانیه می‌باشد. شکل‌های حاصل از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی خواص ساختاری مدل پیش‌بینی شده را تأیید می‌کند.

منابع و مراجع

- [1] Kumar, A., & Singh A., & Ekavali.(2015) A review on Alzheimer's disease pathophysiology and its management: an update. Pharmacol. Rep. 67, 195–203.
- [2] English, N.J. & Waldron, C.J.(2015) Perspectives on external electric fields in molecular simulation: Progress, prospects and challenges, Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 12407–12440.
- [3] Salehi, N., & Lohrasebi, A., & Rezaeisadaat, AM., & Bordbar, A.K. (2022) The influences of cholesterol and AC0107 inhibitor molecules on the Amyloid-beta fibrils aggregation in cell membranes: Molecular modeling approach, Eur. Phys. J. Plus. 137, 460